



Tricho-Guard

Tricho-Guard xüsusi metodla yetişdirilmiş *Trichoderma harzianum*, *Trichoderma viride*, *Trichoderma lignorum* göbələklərin sporlarıdır.

pH=6.5 ±0.5 KƏGV/1ml min. 1x10⁹

Bu göbələklərin sporları aktiv bio-maddələr ifraz edir, yüksək bioloji aktivliyə malik olan və bu səbəbdən torpaqları zənginləşdirən üzvi maddələrin parçalanma proseslərində iştirak edirlər. Ammonium və nitritin parçalanmasında mühüm rol oynayır, torpağı fosfor və kalsiumla zənginləşdirir. Və bu göbələklər tərəfindən ifraz edilən bioaktiv maddələr müxtəlif xəstəliklərdən qoruyaraq bitki və meyvələrin artımını sürətləndirir. Sporlar yeraltı sularında bioloji cəhətdən fəaldır və bitkilərdə bulaşan patogen bakteriya və digər patogen göbələklərin güclü bir rəqibidir və bununla onları yatıraraq basır. *Trichoderma* göbək sporları normal bitki artımı üçün zəruri olan maddələr ifraz edir. Onlar torpaq bioregulyasiyada müxtəlif prosesləri yaradır.

XƏSTƏLİKLƏRƏ QARŞI TƏSİR:

Alternaria, *Anthraxnose*, *Bacterial Fetus Cancer*, *White and gray rot (fomozy)*, *Kela cabbage*, *Peach Curl*, *Mealy dew (oidium)*, *Fruit scab*, *Rhizoctoniosis*, *Perinosporosis (mildew, downy mildew)*, *Phytophthalosis of potatoes and tomatoes*, *Fusarium*, *Black leg şitildə və başqa kötük çürüntülər*.

İSTİFADƏ QAYDALARI: İstifadə etməkdən qabağ göstərilmiş dozada 1 saat ilıq suda (30°C) aktivləşdirilməli və üç gün saxlayın. Spreyləmə və suvarma saat 19:00-dan sonra axşam saatlarında keçirilməlidir.

Bitkinin üzərinə spreyləmə: 1 litr **Tricho-Guard** 1 hektara. 10 gün əkindən sonra tətbiqi başlamaq və 3 dəfə hər 15 gündən bir təkrar etmək.

Torpaqa vermə: Bir illik bitkilər: 2 litr 1 hektar üçün. Torpağı xazarlayan zaman 7-10 gün əkindən əvvəl tətbiq edin. Hər 4 həftədən sonra 2 dəfə təkrarlamaq. Ağaclar: 2 litr 1 hektar üçün. Yazın əvvəlində tətbiq etmək.

Qeyd: İlk tez-tez tətbiq olunan *Trichoderma* torpaq göbələklərinin əlverişli təbəqələrini yaratmaq tələb olunur, ancaq tətbiqlər arasında normal istifadə üçün 4 həftə çəkir.

Fidanların dezinfeksiya edilməsi: 5 ml preparat 1 litr xloruz suda həll olunur. Fidanı 5-10 saniyəlik alınmış məhlulun içinə salın. Prosesi bitkinin torpağa ekilməsindən əvvəl dərhal keçirin.

Toxumların islatması: Bağçılıq: toxumların 1kq başına - 5 ml preparat, 5-7 dəqiqə islatmaq. Əkilməkdən əvvəl dərhal tətbiq edin. Böyük miqyaslı əkinçilik: 2 litr preparat hər toxumun ton başına, 5-7 dəqiqə islatmaq. Əkilməkdən əvvəl dərhal tətbiq edin.

Şitil: 10ml preparat 1 litr xloruz suda həll olunur. Şitillərin köklərini alınan məhlula batırmaq. Əkilməkdən əvvəl dərhal tətbiq edin.

Diqqət: Püskürtmə zamanı 3.4 atmosfer təzyiqi (50 psi) aşmayın. Su ilə qarışdıqdan sonra 6 saat ərzində istifadəni tamamlayın. İstifadə edərkən tibbi maska və gözlük istifadə edin. Preparatı dondurmayın.

Tricho-Guardın təbii çöküntüsü var. **Çalxalayın istifadə edin. Kimyəvi preparatlarla qarışdırıb birgə istifadə etmək qadağandır!!!**

Saxlama:

24 ay quru qaranlıq yerdə +5°C ± 2°C temperaturlarda saxlayın.

12 ay quru qaranlıq yerdə +10°C ± 2°C temperaturlarda saxlayın.

İstehsal tarixinə qabın üzərində baxın.

RAZILAŞMALAR VƏ SERTİFİKATLAR:

- ÖKO GARANTIE
- IAS ACCREDITED test lab.

Qablaşdırma: 1l. plastik qab,
10l. plastik qab,
20l. plastik qab.

aqribioekotex LLC

Nizami 1, Shuvalan setl.,
Baku, Azərbaycan,
tel: (+99412) 4981173,
www.agribioeko.az

Page 1 of 1